

Conditions pour le traitement au Laser fractionnel :

*Si un patient souffre d'herpes il doit prendre une médication spécifique avant un traitement au laser pour éviter l'apparition des symptômes. Acyclovir 800 mg (35 comp.) 1 x jour à démarrer 1 semaine avant le traitement au laser et vider la boîte.

*Le patient doit signaler toute affection du type mélanome et on évitera le traitement dans ces zones.

*Si une période d'acné est en phase active, le traitement peut néanmoins être effectué mais augmente l'inconfort au cours des semaines qui suivent le traitement. Il convient de traiter l'acné et d'effectuer le traitement au laser en période passive d'acné.

*Les « fillers » ne posent pas de problèmes mais on évitera de traiter les zones ou des fillers permanents comme le silicone ont été utilisés.

*Les patients devront impérativement mettre une protection type « écran total » pour se protéger du soleil et exclure toute exposition directe au soleil ou l'utilisation du banc solaire.(3 jours avant le traitement et durant 6 semaines après)

* Le traitement par cette technique est en principe non douloureux. Toutefois comme la douleur et la sensibilité sont très variables d'une personne à une autre ainsi qu'en fonction de la région du corps qui est traitée, une crème ou gel anesthésiant peut-être appliquée avant une intervention. (tube 60g : base Beeler, xylocaïne 3g, Benzocaïne 3g)

* La sensibilité augmente au cours de la période prémenstruelle.

* Au cours de la période post-opératoire il est déconseillé d'enlever les petites croûtes qui apparaissent. Celles-ci participent au processus de guérison. Après le traitement, une sensation de brûlure peut apparaître 30 minutes après et perdurer jusque 3 heures. Un simple crème hydratante peut soulager ce symptôme. Après 3 ou 4 jours la rougeur de la peau prendra une teinte brune. Les petites croûtes apparaissent et leur chute peut être accélérée en appliquant de l'eau bleue :(acide borique 6g, borate de sodium 6g, sulfate de cuivre 0,6g, sulfate de zinc 0,6g pour 600g d'eau) A partir du moment où les croûtes ont disparues on peut appliquer du maquillage. Un œdème peut également apparaître suite au traitement. Celui-ci est toutefois très limité.

* Durée de la période de guérison :

Pour le visage : +/- 5 jours

Pour le cou : +/- 7 jours

Pour le décolleté et les mains : +/- 10 jours

* Le collagène sous-cutané étant stimulé pendant quelques mois, le résultat final du traitement n'est visible qu'au bout de 12 semaines.

* Les fines rides et imperfections mineures peuvent disparaître au bout d'une seule séance. Des rides plus profondes et des cicatrices d'acné peuvent nécessiter plusieurs traitements avec un intervalle d'un mois.

* Le traitement au Laser est un traitement esthétique et ne peut en aucun cas être garanti car opéré sur de la matière vivante.

Je déclare par la suivante avoir pris connaissance des conditions du traitement et compris le contenu. Les réponses aux questions en suspens m'ont été apportées oralement. Je certifie que je suivrai les recommandations reprises et déclare vouloir subir le traitement librement et sous mon entière responsabilité.

Nom : Date de naissance :

Ville : Date :

Signature :